



Mutes higiēna grūtniecības laikā

Grūtniecības laikā topošā māmiņa ir atbildīga ne tikai par savu mutes veselību, bet arī par mazuļa zobiem. Piena zobi mazulim mammas vēderā sāk veidoties laikā no 12. līdz 17. grūtniecības nedēļai.

Lai saglabātu savu un nodrošinātu bērniņa zobu veselību, grūtnieci regulāri jāapmeklē zobi higienists – ieteicams 2 reizes grūtniecības laikā.

Grūtnieci ikdienā jāuzņem vitamīniem bagāts uzturs.

Dažādu vitamīnu trūkums var nelabvēlīgi ietekmēt grūtnieces mutes veselību, kā arī bērna veselību. Konsultējies ar ārstu par vitamīnu un minerālvielu (D vitamīns, kalcijss, fosfors, magnijs, dzelzs, fluors) papildus uzņemšanu.

Grūtniecības laikā atceries!

Nenaškojies ēdienreizē starplaikos! Pēc ēšanas skalo muti ar vārītu ūdeni!

Dzerot kafiju vai tēju ēdienreizē starplaikā, pievieno pienu, cukura vietā labāk izvēlies medu! Lieto fluoru saturošu zobu pastu un zobi diegu!

Zobiem nelabvēlīgā skābe izdalās pastiprināti, lietojot šokolādi, karamelles, saldus cepumus, ābolus, banānus, apelsīnus, rozīnes, dateles, neatšķaidītas sulas, maizi, pārslu brokastis.

SPKC.gov.lv
SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS

sadarbībā ar
PSKUS Zobārstniecības un sejas kīrurģijas centru

Zobu higiēnists:

- noņems mīksto aplikumu un zobakmeni;
- noplūs zobus;
- uzliks fluora gēla aplikācijas zobu audu stiprināšanai;
- iemācis pareizi tīrīt zobus, izmantojot zobu diegu;
- palīdzēs izvēlēties vispiemērotākos mutes dobuma higiēnas līdzekļus;
- nosūtīs pie zobārstā, ja tas būs nepieciešams.

Smaganu apsārtumu, pietūkumu un asiņošanu var mazināt, regulāri un rūpīgi notīrot aplikumu.
Tāpēc **zobu higiēnists jāapmeklē jau grūtniecības sākumā**.

Grūtniecēm kariesa veidošanos veicina bieža našķošanās, kā arī „rīta nelabuma” izraisīta vemšana. Kariesa profilaksei ieteicams lietot fluorīdus saturošas zobu pastas, gēlus un mutes skalojamos šķidumus.

Bieži grūtnieces saskaras ar smaganu problēmām, piemēram, smaganu apsārtums, pietūkums, asiņošana. **Smaganu asiņošana var liecināt par gingivitu – smaganu iekaisumu.**

Gingivīts ir smaganu reakcija uz zobu aplikumu un tajā esošo baktēriju iedarbību.

Grūtniecības gingivīts var sākties grūtniecības otrajā trimestrī, parasti tas beidzas pēc dzemdībām.

Grūtniecības laikā pastāv paaugstināts risks kariesa attīstībai. Tas ir zobu bojājums, ko izraisa cilvēka mutes dobumā esošās baktērijas.

